

5%BSA 封闭液

产品货号: R22010

产品规格: 10ml/50ml/100ml

产品简介:

5%BSA 封闭液 (Blocking Buffer) 适用于 Western Blotting、ELISA 以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后, 可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合, 降低背景, 增强信噪比, 以达到理想的显色效果。

使用方法:

本产品为即用型, 无需稀释。封闭步骤中加入足够量的 BSA 封闭液充分覆盖载体表面, 振荡封闭, 封闭时间依据实验而定, 一般室温封闭半小时至 1 小时, 然后进行抗体孵育等后续操作。

注意事项:

1. 通常在室温封闭 60 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体, 可以 4℃ 封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃ 保存, 一年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>