

# 肉桂酸-4-羟化酶 (C4H) 活性检测试剂盒 (紫外分光光度法)

产品货号: BA1860

产品规格: 50T/48S

## 产品简介:

C4H又称反式肉桂酸-4-单氧化酶,是催化桂皮酸形成咖啡豆、香豆酸的酶。C4H多存在于高等植物、酵母、菌类中,属于细胞木质素合成途径中间的关键酶。

C4H催化肉桂酸和NADPH生成4-香豆酸盐和NADP,在340nm下测定NADPH的减少速率,即可反映C4H活性。

**注意:实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。**

## 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体60mL×1瓶	2-8℃
试剂一	液体40mL×1瓶	2-8℃
试剂二	粉剂×2瓶	2-8℃
试剂三	粉剂×2瓶	2-8℃

溶液的配制:

1. 试剂二:临用前加入3mL乙醇溶解备用。2-8℃保存4周。
2. 试剂三:临用前每瓶加入3mL双蒸水充分溶解待用。现配现用。-20℃分装可保存4周,避免反复冻融。

## 需自备的仪器和用品:

紫外分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL石英比色皿、研钵/匀浆器、乙醇、冰和蒸馏水。

## 操作步骤:

### 一、样本处理(可适当调整待测样本量,具体比例可参考文献)

1. 组织:称取约0.1g组织,加入1mL提取液进行冰浴匀浆。12000g 4℃离心15分钟,取上清,置冰上待测。
2. 细胞或细菌样本的制备:先收集细胞或细菌样本到离心管内,弃上清,按照每500万细胞或细菌加入1mL提取液,超声波破碎细菌或细胞(功率20%,超声3s,间隔10s,重复30次)。12000g,4℃离心15min,取上清,置冰上待测。

### 二、测定步骤

1. 紫外分光光度计预热30min,波长调至340nm,蒸馏水调零。
2. 加样表(在1mL石英比色皿中分别加入):

试剂名称(μL)	测定管
试剂一	700
试剂二	100
试剂三	100
样本	100

充分混匀后立即测定10s时在340nm下的吸光度,记为A1,之后迅速将其放入37℃水浴或37℃培养箱中3min。然后迅速拿出擦净后测定190s时的吸光度,记为A2。计算 $\Delta A=A1-A2$ 。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话:400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ:807961520 731791866

邮箱:zzlybio@126.com

### 三、C4H 酶活计算

#### 1. 按蛋白浓度计算:

单位的定义: 每 mg 组织蛋白在反应体系中每分钟减少 1nmol NADPH 的酶量定义为一个酶活性单位。

$$\text{C4H 酶活 (U/mg prot)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V \text{ 反总}] \div (V \text{ 样} \times C_{\text{pr}}) \div T = 535.91 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

#### 2. 按样本质量计算:

单位的定义: 每 g 组织在反应体系中每分钟减少 1nmol NADPH 的酶量定义为一个酶活性单位。

$$\text{C4H 酶活 (U/g 质量)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V \text{ 反总}] \div (W \div V \text{ 提取} \times V \text{ 样}) \div T = 535.91 \times \Delta A \div W$$

#### 3. 按细胞或细菌个数计算:

单位的定义: 每  $10^4$  个细胞或细菌在反应体系中每分钟减少 1nmol NADPH 的酶量定义为一个酶活性单位。

$$\text{C4H 酶活 (U/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V \text{ 反总}] \div (500 \div V \text{ 提取} \times V \text{ 样}) \div T = 1.072 \times \Delta A$$

V 反总: 反应总体积, 0.001L;  $\epsilon$ : NADPH 的摩尔消光系数,  $6.22 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$ ; d: 比色皿光径, 1cm; V

样: 加入的样本体积, 0.1mL; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; V 提取: 提取液体积, 1mL; 500: 500 万个细胞; T: 反应时间, 3min;  $10^9$ : 单位换算系数,  $1\text{mol} = 10^9 \text{ nmol}$ 。

#### 注意事项:

当  $\Delta A$  大于 0.4 时, 建议将样本用提取液稀释后测量;  $\Delta A$  过小时, 建议增加酶促反应时间 (5min 或 10min) 或增加加入的样本体积来测定。

#### 实验实例:

#### 1. 取 0.1g 黄豆 (发芽) 加入 1mL 提取液进行匀浆研磨, 取上清后按照测定步骤操作, 测得计算

$\Delta A = A_1 - A_2 = 1.643 - 1.510 = 0.133$ , 按样本质量计算酶活得:

$$\text{C4H 酶活 (U/g 质量)} = 535.91 \times \Delta A \div W = 535.91 \times 0.133 \div 0.1 = 712.76 \text{ U/g 质量}。$$



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com