

糖原含量试剂盒(硫酸-蒽酮比色法)(微板法)

产品货号：BA3388

产品规格：96样

产品简介：

糖原是由葡萄糖分子通过糖苷键聚合而成的高分子物质，作为重要的能源物质储存于肝脏、肌肉和脑等重要器官。糖原的储存或代谢异常可引起多种疾病，因此测定糖原含量的变化，对研究糖原代谢及相关疾病有着重要的意义。

采用蒽酮法：即利用强碱性提取液提取糖原，浓硫酸是糖原脱水生产糖醛衍生物，糖醛类与蒽酮作用，在620nm处有最大吸收峰，再与相同方法处理的葡萄糖标准液比色定量。

产品内容：

产品名称	规格	保存条件	注意事项
提取液	液体30mL×1瓶	2-8°C	
试剂一	粉剂2瓶	2-8°C，避光	每瓶： 1. 开盖前注意使粉体落入底部（可手动甩一甩）； 2. 加入10mL浓硫酸，充分溶解混匀后使用； 3. 用不完的试剂4°C保存4-5天。
标准品	粉剂1支	2-8°C	1. 从标准管中称量取出2mg至一新EP管中； 2. 加入2mL蒸馏水溶解即1mg/mL的葡萄糖标准品溶液； 3. 再稀释50倍即0.02mg/mL标准品备用； 4. 保存周期与试剂盒有效期相同。

实验器材：

研钵（匀浆机）、冰盒（制冰机）、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅（烘箱、培养箱、金属浴）、96孔板、离心管、酶标仪、浓硫酸（不允许快递）、蒸馏水（去离子水、超纯水均可）。

指标测定：

建议先选取1-3个差异大的样本（例如不同类型或分组）进行预实验，熟悉操作流程，根据预实验结果确定或调整样本浓度，以防造成样本或试剂不必要的浪费！

1. 检测液制备：

A: 按照肝脏/肌肉样本质量(g)：提取液体积(mL)为1: 3的比例加入提取液（如取0.1g组织，加0.3mL提取液），盖紧管盖（用封口膜封口）95°C水解20min，室温冷却后即为糖原水解液。

①肝糖原检测液：在冷却后的糖原水解液EP管中加入0.7mL蒸馏水混匀总体积约1mL，8000rpm室温离心5min，取上清液100μL至新EP管中，再加900μL蒸馏水即上清液稀释10倍后作为检测液测定。

②肌糖原检测液：在冷却后的糖原水解液EP管中加入0.7mL蒸馏水混匀总体积约1mL，8000rpm室温离心5min，取上清液200μL至新EP管中，再加200μL蒸馏水即上清液稀释2倍后作为检测液测定。

③糖原含量低的组织样本：在冷却后的糖原水解液EP管中加入0.7mL蒸馏水混匀总体积约1mL，8000rpm室温离心5min，取上清液作为检测液测定。

B: 细胞样本：



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信

先收集细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细胞加 0.25mL 提取液，盖紧管盖（用封口膜封口）95°C 水解 20min，室温冷却后再加 0.25mL 蒸馏水混匀，若浑浊则 8000rpm 室温离心 5min，取上清液作为检测液测定。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（ 10^4 ）：提取液（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

2. 检测步骤：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 620nm，所有试剂解冻至室温（25°C）。

② 在 EP 管中依次加入：

试剂组分（ μL ）	空白管（只做一次）	标准管（只做一次）	测定管
蒸馏水	100		90
标准液		100	
检测液			10
试剂一	200	200	200
混匀，置 95°C 水浴 5min（盖紧，防止水分散失），冷却，取 200 μL 转移至 96 孔板中，于 620nm 读取吸光值 A。			

【注】若 A 测定管值在零附近，可以增加测定管上样量 V 检测液（如增至 40 μL ），蒸馏水相应减少，则改变后的 V 检测液代入计算公式计算。

结果计算：

1. 按样本重量计算：

$$\begin{aligned} \text{糖原}(\text{mg/g}) &= (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times (C \text{ 标准} \times V \text{ 标}) \div (V \text{ 检测液} \div V \times W) \div 1.11 \times D \\ &= 0.0018 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V \text{ 检测液} \div V \times W) \times D \end{aligned}$$

2. 按细胞数量计算：

$$\begin{aligned} \text{糖原}(\mu\text{g}/10^4 \text{ cell}) &= (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times (C \text{ 标准} \times V \text{ 标}) \times 10^3 \div (V \text{ 检测液} \div V_1 \times 500) \div 1.11 \times D \\ &= 1.8 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V \text{ 检测液} \div V_1 \times 500) \times D \end{aligned}$$

3. 按蛋白浓度计算：

$$\begin{aligned} \text{糖原}(\text{mg/mg prot}) &= (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \times (C \text{ 标准} \times V \text{ 标}) \div (V \text{ 检测液} \div V \times C_{\text{pr}}) \div 1.11 \times D \\ &= 0.0018 \times (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 标准} - A \text{ 空白}) \div (V \text{ 检测液} \div V \times C_{\text{pr}}) \times D \end{aligned}$$

V 标---0.1mL； V 检测液---0.01mL； V---提取液总体积，1mL； V₁---细胞提取液，0.5mL；

C 标准---标准品浓度，0.02mg/mL； W---取样量，g； 500---细胞数量，万；

D---样本测试前稀释倍数，肝糖原 D 值为 10，肌糖原 D 值为 2；

1.11---是此法测得葡萄糖含量换算为糖原含量的常数；

C_{pr}---蛋白浓度（mg/mL）；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信